

OPERATION PÅ ØJENLÅG – INFORMATION OG VEJLEDNING

Operationens formål er at rette en uhensigtsmæssig stilling af øjenlåget ved f.eks. at fjerne overskydende hud fra øvre øjenlåg, eller fjerne poser under øjet. Operationen udføres i lokalbedøvelse hvor overskydende hud fjernes og der sys. Normalt er der ingen smerter under indgrebet. Efter ca. 1 uge fjernes de tråde, som er brugt til at lukke såret/sårene.

FØR OPERATIONEN

Hold pause med blodfortyndende medicin efter nærmere aftale med lægen. Den blodfortyndende medicin indtages atter dagen efter operationen medmindre andet er aftalt. Bisidder er velkommen. Undgå kosmetik i øjenomgivelserne lige inden operationen.



Før



Efter

PRISER

1. Ved en såkaldt funktionel indikation betaler Regionen (altså det kommunale system)
2. Ved en såkaldt kosmetisk indikation påhviler betaler patienten. Ved forundersøgelsen fortæller speciallægen dig om klinikkens vurdering. Du kan endvidere læse om hvilken kategori du tilhører i afsnittet om kosmetisk og funktionel indikation i uddrag om "overskydende hud på øvre øjenlåg – faglige visitationslinjer afsnit 2. (du kan få en kopi af dette af sekretæren i vores reception)

Pris for indgreb på 1 øjenlåg er 5.800.- DKK

Pris for indgreb på 2 øjenlåg er 9.400.- DKK

EFTER OPERATIONEN

Smerter

Isposer lindrer smerter og hæmmer hævelse. Lægges på øjenomgivelserne 15 minutter – 4 x dagligt de første døgn. Medicin mod smerter skal være Paracetamol (Pamol, Panodil, Arax) 2 stk. á 500 mg, maksimalt 6 tabletter på et døgn.

En god idé er at tage smertestillende medicin FØR bedøvelsen fra operationen forsvinder. Smerterne er stærkest i de første 5-8 timer efter operationen, og aftager oftest inden et døgn.

Motion

Hold pause med motion i 2 uger efter operationen.

Du må gerne gå i brusebad og vaske hår. Du må i de 2 uger ikke gå i svømmehal, eller bruge kosmetik på øjenlågene.

Blødning

Let siveblødning kan forekomme det første døgn. Det er helt normalt og kan duppes væk med ren klud eller serviet. Hæv hovedlejet når du ligger ned. (ca. 30 grader)

Hævelse

Hævelse med misfarvning blå/rød (senere gul/brun) er harmløs. Det skyldes blødning under huden og forsvinder i løbet af ca. 2 uger. Hævelser tager til de første dage, og klinger så af. Hævelse er ikke udtryk for en betændelsestilstand.

Betændelse

For at forebygge mod betændelse smøres sår med antibiotisk salve 4 gange dagligt indtil trådene er fjernet; og 4 gange dagligt 2 dage yderligere. Betændelse er sjælden og optræder først efter 2-3 dage. Symptomer er forværring af smertefølelse – f.eks. en dunkende fornemmelse. Huden bliver rød og varm. Gulligt pusflod kan forekomme.

Arvæv

Sol på arret kan give pigmentforskel i form af mørke ar.

Brug solbriller og solblokker med højt faktortal.

Komplikationer

En meget sjælden komplikation er blødning bag. øjet. Symptomer her er pludseligt aftagende syn og fremstående øje. Det kræver øjeblikkelig behandling. Utsigtet over- eller underkorrektur af øjenlåget, som i udvalgte tilfælde vil kræve yderligere operation. Ved problemer kontaktes øjenklinikken.