

SLT (selektiv laser trabekuloplastik)
til behandling af
grøn stær (glaukom)



Princip

Man behandler afløbskanalen i øjet med laser, så væsken i øjet lettere kan løbe fra øjet. Afløbet i øjet kan sammenlignes med en finmasket si, hvor laserbehandlingen på afløbet laver større huller i sien. På den måde falder trykket.

Behandlingen

Selve behandlingen foregår ved, at en kontaktlinse sættes på øjet. På den måde kan man se og behandle afløbet.

Behandlingen tager 5-10 minutter og er, bortset fra det lette ubehag ved kontaktlinsen, smertefri. Du vil før behandlingen blive overfladebedøvet med de dråber, man plejer at bruge, før der måles tryk i øjet. Endvidere vil der blive givet en dråbe tryknedsættende medicin samt en dråbe, der forebygger irritation og regnbuehindebetændelse.

Efter 1 time måles trykket i øjet, og hvis det er normalt, kan man gå hjem. Trykket måles efter 1 uge, og her ser man også efter regnbuehindebetændelse. Får man smerter eller sløret syn, skal man ses på før, her skal du ringe til øjenlægen.

Efterkontrol

Øjentrykket skal kontrolleres 1 time, 1 uge og 1 måned efter endt behandling, og man skal derefter følge sine øjenlægekontroller som vanligt.

Effekt

Behandlingen virker hos mere end 85% og kan gentages. Du skal stadig gå til øjenlægekontroller som før, da virkningen kan fortage sig med tiden, den kan så gentages.

Bivirkninger

Lige efter behandlingen kan synet virke sløret, da der har været en kontaktlinse i øjet. Der er sjældent bivirkninger ved behandlingen. Ca. 1% får en regnbuehindebetændelse, der oftest er mild, ca. 1% får tryk-stigning og ca. 1% får lettere irritative gener i dagene efter.

Hvis der opstår spørgsmål undervejs i forløbet, er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte klinikken.



Speciallæge i øjensygdomme
Jens Lundgaard Andresen

(Revideret 23.04.2018)